

- ▶ **Cabinet dentaire du Dr DEMONCEAUX**  
Orthodontie exclusive par aligneurs à Crepy-en-Valois et Paris
- 📍 14 rue Hippolyte Clair 60800 Crépy en Valois, Oise
- ☎ Tel. : +33 3 44 87 72 33
- 🌐 [selarl-olivier-demonceaux.chirurgiens-dentistes.fr](http://selarl-olivier-demonceaux.chirurgiens-dentistes.fr)

# Dégagement orthodontique d'une canine incluse

**Les canines ont parfois du mal à prendre leur place sur l'arcade dentaire et il arrive qu'elles ne puissent pas se positionner correctement.**

Si l'évolution d'une canine n'est plus possible, elle reste bloquée et l'on appelle ce phénomène la canine incluse. Son parcours peut être dévié vers l'extérieur (côté de la joue) ou à l'intérieur vers le palais.

L'une des causes possibles de cette inclusion est le maintien d'une dent temporaire qui aurait dû tomber. La canine n'a pas réussi à ronger la racine de la dent de lait.

## CONSÉQUENCES DE L'INCLUSION

- ▶ Présence d'un espace entre l'incisive latérale et la prémolaire. Cet espace va partiellement diminuer au fil du temps, mais la situation ne fera que s'aggraver dans le futur.
  - ▶ Usure dentaire résultant de cette malocclusion mais également, par un effet domino, d'autres désordres au niveau de l'arcade.
- La désinclusion doit alors se faire à l'aide d'un traitement orthodontique.



## ÉTAPES DE LA DÉSINCLUSION

- ▶ Dégagement chirurgical de la gencive puis de l'os qui recouvre la canine.
- ▶ Fixation d'un système de traction sur la canine pour la guider vers la position recherchée.
- ▶ Quand la canine est assez descendue vers l'arcade, la ligature et l'attache sont retirées.
- ▶ La canine se place peu à peu sur l'arcade dentaire.

## À SAVOIR

Plusieurs facteurs peuvent influencer le résultat du traitement : sévérité de l'inclusion, âge du patient et sa motivation.

Un examen préalable, approfondi, est à effectuer avec votre orthodontiste afin de déterminer la solution la plus appropriée.